

## NJEGA USTA POSLJE ORALNOKIRURŠKIH ZAHVATA

Da bi izbjegli neugodnosti i nezgode poslje oralno-kirurških zahvata nužno je pridržavati se slijedećih uputa:

### ISPIRANJE:

Danas nemojte ispirati usta. Zubi se moraju prati kao i obično. Dan nakon zahvata, ako nema krvarenja, svaka četiri sata ispirite usta otopinom načinjenom od jedne žlice soli otopljene u jednoj litri vode ili čajem od kadulje (žalfije).

### KRVARENJE:

Minimalno krvarenje može se očekivati dva do tri dana poslje zahvata. U slučaju jakog i produljenog krvarenja odmah se javite liječniku ili dežurnoj stomatološkoj ambulanti. Ako to niste u mogućnosti učiniti, možete si pomoći tako da stavite preklopjeni komad sterilne gaze preko mesta koje krvari. Zagrizite preko toga i držite blago stisnuto oko pola sata. Postupak možete ponoviti više puta. Ako krvarenje u međuvremenu ne prestane javite se liječniku.

### OTEKLINA:

Otekli poslje operacije nije neuobičajena pojava i ne predstavlja opasnost. Da bi je spriječili, na kožu iznad operiranog mjesta u toku prvih dvanaest sati poslje zahvata stavljamte svakih 15-30 minuta led zamotan u plastičnu vrećicu i tkaninu ili hladan oblog.

### BOL:

Ako imate bolove uzmite svakih 4-6 sati 1-2 tablete protiv bolova koje inače koristite (kafetin, Ketonal, Plividon, Voltaren rapid). Nemojte uzimati tablete koje sadrže acetilsalicilnu kiselinu (Andol, Aspirin), jer produljuju krvarenje.

### ISHRANA:

Možete jesti uobičajenu hranu. Poželjno je u toku prvog dana jesti tekuću ili kašastu hranu. Treba izbjegavati tople napitke. Ne koristite zrnatu i sličnu hranu koja se može nakupljati u rani.

### PUŠENJE:

Ne smijete pušiti 3-4 sata poslje zahvata, i dok postoji krvarenje.